

# INFORMACION E INSTRUCCIONES CONCERNIENTES A EXTRACCIONES SIMPLES

## LUEGO DE UNA EXTRACCION

### SANGRAR

MUERDA LA GAZA FIRMEMENTE POR UNA HORA. DESPUES DE UNA HORA , REMUEVA LA GAZA, ES RECOMENDABLE QUE SE TOMEN DOS PASTILLAS DE TYLENOL O IBUPROFEN AHORA, Y REPETIR, DOS PASTILLAS CADA CUATRO HORAS. CIERTA CANTIDAD DE SANGRAMIENTO ES NORMAL LUEGO DE UNA EXTRACCION, PERO SI CONTINUAS SANGRANDO FUERTE, REPITE EL PROCESO DE MORDER UNA GAZA POR UNA HORA. EVITE EJERCICIOS.

### DOLOR:

CIERTA CANTIDAD DE DOLOR ES COMUN DESPUES DE UNA EXTRACCION. SI EL TYLENOL O ADVIL NO ES SUFICIENTE, DEBE DE OBTENER UNA RECETA.

### HINCHAZON:

PARA REDUCIR LA HINCHAZON DESPUES DE UNA EXTRACCION COMPLICADA APLIQUE UNA BOLSA DE HIELO EN LA CARA SOBRE EL LUGAR OPERADO, CADA 15 MINUTOS.

### ENJUAGUES BUCALES:

LA VIBRACION VIGOROSA DE LA BOCA PUEDE CAUSAR MAS SANGRAMIENTO. NO SE ENJUAGUE LA BOCA HASTA EL SIGUIENTE DIA CON UNA SOLUCION DE AGUA CALIENTE Y SAL.  
(1 CUCHARADA) 5-10 VECES AL DIA POR SIETE DIAS.  
DURANTE EL PROCESO DE SANACION. TRATAR DE NO COMER EN EL LADO

### OPERADO

Y EVITE ALIMENTOS DIFICILES DE MASTICAR.

### **FRAGMENTOS DE HUESO:**

DURANTE EL PROCESO DE SANACION PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE HUESO PUEDEN DESPRENDERSE , ESTOS HUESOS NO SON RAICES Y GENERALMENTE SON EXPULSADOS POR SI MISMOS , PERO SI SON MOLESTOS , REGRESE A LA OFICINA PARA REMOVERLOS.

### **DOLOR E HINCHAZON:**

SI ESTOS OCURREN LUEGO DE SANAR LA HERIDA, VENGA A LA OFICINA PARA EXAMINARLE.

## EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA O PREGUNTAS CONTACTENOS

Dr. Malouf / Dr. Sarbera  
366 Broadway  
Somerville, Ma 02145  
(617) 628-8000